

Bedömning Födelserelaterad plexus brachialisskada (OBP)

Vid **2-4 veckors** ålder görs bedömning enligt Narakas gradering

Grupp 3 och 4 remitteras snarast, se "Remittentinformation OBP"

Grupp 1 och 2 följs och bedöms igen vid 6-8 veckors ålder

Narakas gradering

Grupp 1	C5 - 6 paralys skuldra, ingen flexion armbåge
Grupp 2	C5-7 som ovan + ingen ext handled
Grupp 3	komplett paralys
Grupp 4	komplett paralys + Horner (mios,ptos)

Vid **6-8 veckors ålder** bedöms aktiv rörlighet mot gravitationskraften i den påverkade armen enligt tabell nedan.

Rörelsen bedöms som: 0=ingen funktion, 1=kraft mot tyngdkraften eller 2=full rörelse mot tyngdkraft. Den passiva rörligheten i utåtrotation i axelleden kontrolleras.

Rörelse	mot gravitation	PROM
Armbåge flexion		
Armbåge extension		
Handled extension		
Fingrar extension		
Tumme extension		

PROM= Passivt rörelseomfång (sidlikt/inte sidlikt)

Om det finns en skillnad i hur barnet rör på armarna eller om det finns en passiv stelhet i någon led remitteras patienten, se "Remittentinformation OBP".