

Bedömning Födelserelaterad plexus brachialisskada (OBP)

Bedömning varje eller vartannat år tills barnet är färdigväxt



















Rörelse	AROM	PROM	AROM	PROM	AROM	PROM
Skuldra flex						
Abd						
Utrot i add						
Utrot i abd						
Armbåge flex						
Ext						
Underarm supin						
Pron						
Handled ext						
Fingrar ext						
Flex						
Tumme ext						
Handfunktion						

AROM= aktivt rörelseomfång I °, PROM= passivt rörelseomfång I °

Handfunktionen graderas enligt: 1) god gripfunktion, 2) stödhand med begränsat grepp 3) ingen gripfunktion.

Mallet score används från cirka 3 års ålder:

Modified Mallet classification (Grade I = no function, Grade V = normal function)

	Not Testable	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV	Grade V
Global Abduction	Not Testable	No function	 <30°	 30° to 90°	 >90°	Normal
Global External Rotation	Not Testable	No function	 <0°	 0° to 20°	 >20°	Normal
Hand to neck	Not Testable	No function	 Not possible	 Difficult	 Easy	Normal
Hand to spine	Not Testable	No function	 Not possible	 S1	 T12	Normal
Hand to mouth	Not Testable	No function	 Marked trumpet sign	 Partial trumpet sign	 <40° of abduction	Normal
Internal rotation	Not Testable	No function	 Cannot Touch	 Can touch with wrist flexion	 Palm on belly No wrist flexion	Normal

BPOM (Brachial Plexus Outcome Measure) samt COPM (Canadian Occupational Performance Measure, där föräldrarna skattar när barnet är <8 år), kan användas från cirka 3 års ålder före och efter en intervention.