

Vaccination mot influensa och pneumokocker - generellt direktiv om läkemedelsbehandling

Berörda enheter

Enhet:

(Fylls i av respektive enhet)

Syfte

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot influensa och pneumokocker enligt HSLF-FS 2017:37

Influensa- och pneumokockvaccination enligt generellt direktiv om läkemedels-behandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan efter genomgången utbildning som är godkänd av verksamhetschefen.

Indikationer för influensavaccination med förstärkt vaccin Fluad

- Brukare 65 år och äldre boende på SÄBO
- Personer 65 år och äldre med hemsjukvård

Indikationer för influensavaccination

Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan administrera influensavaccin till vuxna personer som tillhör nedan beskrivna grupper som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa, förutsatt att personen saknar kontraindikation för influensavaccination.

- personer 65 år och äldre
- gravida efter graviditetsvecka 12
- vuxna personer med följande sjukdomar eller tillstånd:
 - kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - diabetes mellitus
 - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom
 - generellt nedsatt hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
 - generellt nedsatt hälsa på grund av bruk av narkotika och/eller riskbruk av alkohol

Förutom till patienter kan sjuksköterskor som omfattas av generella direktiv även administrera influensavaccin till *personal* anställda hos Region Västerbotten som saknar kontraindikation för vaccination.

Indikationer för pneumokockvaccination

Samma riskgrupper som för influensavaccination, utom gravida, omfattas av de generella direktiven för pneumokockvaccination. Utöver dessa omfattas även de som tidigare haft invasiv pneumokockinfektion, rökare, svetsare och personer med alkohol- eller narkotikaberoende. Vaccination upprepas till riskgrupper med minst 5 års intervall.

Personer med mycket nedsatt immunförsvar, splenektomerade, de med cystisk fibros samt patienter med Likvorläckage, skallbasfraktur och kokleaimplantat skall vaccineras med annat pneumokockvaccin (Prevenar 20, tidigare kallat Appexnar), detta vaccin omfattas ej av de generella direktiven.

Kontraindikation

Innan ställningstagande till administrering av influensavaccin till patient eller personal ska personen fylla i "*Hälsodeklaration vid vaccination*".

Läkare kontaktas för bedömning om personen tidigare haft en allvarlig allergisk reaktion som krävt behandling på sjukhus, t.ex. av ägg eller annat födoämne, läkemedel eller vaccin.

Vid pågående infektion/feber bör vaccinationen senareläggas.

Läkemedel för behandling av anafylaxi eller annan överkänslighetsreaktion ska alltid finnas tillgänglig vid vaccination.

Dosering vuxna

Fluad (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-pack.

Vaccinet ska ges till brukare 65 år och äldre på SÄBO och personer 65 år och äldre med hemsjukvård, ges en gång per influensasäsong.

Dos vuxen: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vaxigrip (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-pack.

Vaccinet ska till vuxna ges en gång per influensasäsong.

Dos vuxen: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vid blödningsbenägenhet kan vaccinet ges subcutant.

Pneumovax (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta.

Dos vuxen: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vid blödningsbenägenhet kan vaccinet ges subcutant.

Dokumentation

Influensa- och pneumokockvaccination dokumenteras enligt gällande rutin för vaccinationer.

Datum:

Medicinsk ansvarig läkare:

Namnförtydligande:

Det generella direktivet ska uppdateras och signeras inför varje influensasäsong.