

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED DABIGATRAN VID FÖRMAKSFLIMMER

Vid förmaksflimmer kan det finnas risk att blodproppar bildas som konsekvens av att hjärtat slår oregelbundet. Du har nu fått läkemedlet dabigatran som minskar risken att drabbas av stroke (blodproppar i hjärnan).

HUR DABIGATRAN TAS

Dabigatran doseras två gånger dagligen, morgon och kväll, samma tidpunkt varje dag. Du ska svälja kapseln med ett glas vatten. Kapseln ska sväljas hel, den får inte tuggas, krossas eller öppnas.

För att få ut kapslarna ur blisterkartorna är det viktigt att du drar bort folien på baksidan av blisterkartan och inte trycker ut dem.

Det är viktigt att du inte glömmer att ta dabigatran eftersom du då får sämre effekt av läkemedlet.

Om du glömmer att ta en dos av dabigatran och det är mer än 6 timmar kvar tills du ska ta kommande dos, ska du så snart som möjligt ta den. Om det är mindre än 6 timmar kvar till kommande dos av dabigatran ska du invänta den kommande dosen och ta den som vanligt. Ta ALDRIG dubbel dos för att kompensera missad dos.

Behandlingen med dabigatran är ofta livslång. Avbryt ALDRIG behandlingen utan att tala med din läkare.

UPPFÖLJNING AV DABIGATRANBEHANDLINGEN

Vid förmaksflimmer används styrkorna 150 mg och 110 mg. Vilken styrka du får beror på flera olika faktorer. En viktig faktor är njurfunktionen och därför behöver den kontrolleras med blodprov var 12:e månad före receptförnyelse, ibland oftare.

DABIGATRAN I KOMBINATION MED ANDRA LÄKEMEDEL

Tala alltid om för dina vårdgivare vilka läkemedel du tar inklusive kosttillskott, naturläkemedel och receptfria läkemedel. Vissa preparat kan öka risken för blödningar, andra kan minska effekten av dabigatran.

Du ska inte använda följande receptfria preparat i kombination med dabigatran utan att diskutera med vården först:

- NSAID – exempelvis ibuprofen (Ipren, Ibumetin m.fl.), naproxen (Pronaxen), diklofenak (Voltaren), acetylsalicylsyra (Treo, Bamyl, Aspirin m.fl.) Dessa kan i kombination med dabigatran orsaka allvarliga blödningar.
- Naturläkemedel och kosttillskott

BIVERKNINGAR

Dabigatran tolereras ofta väl och har mer positiva effekter än negativa. Men precis som med alla läkemedel finns risk för biverkningar.

- Dabigatran påverkar blodets förmåga att koagulera. Detta leder till att det finns ökad risk för blödning.
 - När man behandlas med ett sådant läkemedel kan man lättare få blåmärken, blödning från näsa och småsår där blödningen har svårare att sluta. Ifall det blir ohållbart kontaktar du vården.
 - Vid oväntad blödning från tarm, urinvägar och underliv ska du kontakta vården.
 - Om kraftig blödning uppstår, om en blödning spontant inte slutar av sig själv eller om du fått ett hårt slag mot huvudet, magen eller bröstet ska du åka till akutmottagning eller ringa 112.
- Dabigatran kan ge magbesvär. Om detta uppstår kan du testa ta kapslarna med mat. Tänk på att svälja kapslarna hela, eftersom risken för blödningar annars ökar.

HUR DABIGATRAN FÖRVARAS

Eftersom dabigatran kapslarna är fukt känsliga ska du inte dra bort folien förrän du ska ta kapseln. Detta innebär också att kapslarna inte ska fördelas ut i dosett eller i dosrulle, utan dessa måste förvaras i originalförpackning.

Förvara förpackningen på ett torrt ställe och i rumstemperatur.