

Aktuell prioritering för vaccination mot Covid-19 gällande region Västerbotten 2021-06-18

Detta dokument uppdateras löpande: <https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardepersonal/vaccination>

Region Västerbotten följer FoHMs rekommendation om prio-ordning och har utöver den centralt beslut om några tillägg.

- Brukare inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård. Vuxna medboende ska erbjudas vaccin.
- Personer födda 1981 eller tidigare.
- Vuxna som bor i samma hushåll som personer som är födda 1952 eller tidigare.
- Personer som utretts och accepterats för organtransplantation och vuxna medboende.
- Personer som behandlas med dialys och deras vuxna medboende.
- Organ-benmärgs- eller stamcellstransplanterade och deras vuxna medboende.
- Personer som enligt behandlande läkare har behov av vaccinet *inför nystart eller omstart i* behandling med rituximab*. Vaccin ska då även erbjudas personens vuxna medboende.
- Personer 18 år eller äldre som har Downs syndrom eller beslut enligt LSS eller som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
- Vård- och omsorgspersonal** 18 år eller äldre (inkl. vikarier, AT-läkare och studenter i VIL/VFU) som har tät och långvarig kontakt med personer som tillhör någon av ovan nämnda grupper.
- Vuxna med någon av följande sjukdomar/hälsotillstånd
 - kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
 - kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma.
 - mycket kraftigt överviktig (BMI som är 40 eller mer)
 - flera funktionsnedsättningar.
 - neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 - kronisk leversvikt eller kronisk njursvikt.
 - diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 - kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
- Vuxen gravid i vecka 12 + 0 eller längre gången. Vissa riskindivider kan av läkare ordinerats vaccinet i tidigare skede: [Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten \(folkhalso myndigheten.se\)](#)
- Gravida i vecka 12+0 eller längre gången som är 16 - 18 år och som ordinerats Pfizers vaccin av läkare
- Vuxna med ett tillstånd som innebär svårighet att följa råd om smittskyddande åtgärder.
[Rekommendationer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten \(folkhalso myndigheten.se\)](#)
- Barn 16 - 18 år med någon av de sjukdomar/hälsotillstånd som BLF anger i sina rekommendationer och som har ordinerats Pfizers vaccin av läkare [BLF-Rekommendationer-för-vaccination-mot-covid-19-för-särskilda-grupper-av-barn-och-ungdomar-från-16-års-ålder-20210501.pdf \(regionvasterbotten.se\)](#)
- De som för att kunna studera utomlands** behöver vara fullvaccinerade inför studiestarten.

Preliminär vaccinations-start: född 1991 eller tidigare från slutet av v. 25. Alla vuxna från mitten av v 27.

Val av vaccin och dos-intervall

Dos-intervall får inte underskrida rekommendation. Vid längre intervall än rekommenderat max ska anledning noteras i patientjournal.

- Personer födda 1956 eller tidigare kan ges alla vaccin om de inte tillhör särskild behovsgrupp (se nedan).
- Personer födda 1957 eller senare ska erbjudas Modernas eller Pfizers vaccin.
- Barn 16 – 18 år kan vid vissa hälsotillstånd eller graviditet ordinerats Pfizers vaccin.
- Dosintervall Astra: 10 veckor (min 6 max 12), Moderna 7 veckor (min 4 max 7), Pfizer: 7 veckor (min 3 max 7).
- Personer födda år 1957 eller senare och som fått dos 1 av Astras vaccin ska 12 - 15 veckor (min 9 max 15) efter att ha fått en dos Astras vaccin erbjuds dos 2 av ett mRNA-vaccin. De kan *på egen begäran*, vaccineras med Astras vaccin för dos 2 i stället för erbjuden mRNA-dos. De är fullvaccinerade efter att ha fått dos 2 oavsett vaccin-val.
- Transplanterade, dialyserade och de som väntar på transplantation eller ny/omstart i behandling med rituximab* ska erbjudas Pfizers eller Modernas vaccin, obs att dosintervall för dessa bör vara så kort som möjligt (3 resp 4 v).
- **Utlands-studerande kan erbjudas dos 2 med kortare dos-intervall än 7 veckor om det behövs för att hinna bli fullvaccinerad före terminsstart. Dosintervall får ej underskrida minsta tillåtna (Pfizer 3 veckor, Moderna 4 veckor).**

*Generiskt läkemedelsnamn. Tillhandahållna synonympreparat: MabThera, Ritemvia, Rixathon, Ruxience, Truxima

** ska vid vaccinationstillfället visa upp bevis om anställning/placering/utlandsstudier.