

Provtagning för covid-19-övervakning

Fastställande: 2020-03-19 version 2 (första version versionen publicerades 2020-03-17)

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att ta prov för covid-19 på vid indikation för att hitta oförutsedda fall bland patienter och för att förhindra smittspridning från sjukvårdspersonal. Vid sådan provtagning betraktas inte den person som testas som smittad och handläggs därför utan särskilda rutiner för covid-19. Provtagningen ska betraktas som screeningprovtagning och infektionsjouren ska alltid kontaktas för diskussion innan provtagningen.

Övervakningsprovet tas på ineliggande patienter med akut nedre luftvägsinfektion eller atypisk pneumoni **där ingen riktad klinisk misstanke om covid-19 finns.**

Analysbeställning i RoS finns under fliken Klinisk mikrobiologi, luftvägar, nasofarynxsekret SARS-CoV-2-övervakning.

För övervakningsprovet räcker det med ett prov från NPH. Provet tas med NPH-pinne i eSwab-rör med blå kork och **skickas till klinisk mikrobiologi NUS på vanligt sätt.**

Det är viktigt att NPH-provet tas på rätt sätt för att få ett representativt prov. Provtagningspinnen förs försiktigt längs näshålans botten mot bakre svalgväggen med en roterande rörelse. Låt pinnen ligga kvar några sekunder. Stoppa pinnen i röret med vätska och bryt av pinnen vid skåran.

Övervakningsprovtagning innebär inga särskilda restriktioner avseende övrig provtagning på patienten, t ex odlingsprover.

Om riktad klinisk misstanke om covid-19 finns är det inte ett övervakningsprov som ska tas utan patienten handläggs då enligt <https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/aktuellt> och prov tas enligt provtagningsanvisning för coronavirus SARS-CoV2.

Utfärdare:

Maria Marklund

Annika Osterman

Jens Backman

Läkare vårdhygien

Läkare Klinisk mikrobiologi

Läkare Infektionskliniken