

Riktlinjer för covid-19 och influensavaccination i Västerbotten 2025–2026

Innehållsförteckning

Inför säsongen 2025–2026	2
Bakgrund.....	2
Viktiga datum inför höstens vaccinationskampanj	3
Personer som rekommenderas samvaccination mot covid-19 och influensa	3
Ytterligare info om rekommendationer kring covid-19 vaccination	4
Personer som rekommenderas enbart influensavaccinering	4
Kombination med andra vacciner	5
Pneumokockvaccination	5
Patientinformation	5
Behandlings- och bedömningsstöd.....	5
Äggallergi eller blödningsbenägenhet	5
Allergiberedskap och behandling	6
Observationstid efter vaccination.....	6
Vaccination i hemmet	6
Antiviral läkemedelsbehandling vid influensa	6
Influensavaccination av sjukvårdspersonal.....	6
Regionanställda	6
Kommunal vårdpersonal.....	6
Hälsodeklaration och registrering i Mittvaccin	7
Upphandlade vacciner för influensa och covid-19.....	7
Beställning vaccin och kanyler inom Region Västerbotten	7
Behörighet att ordinera och administrera vaccin	8
Avgifter för patient inom Region Västerbotten	9

Inför säsongen 2025–2026

- Inför denna säsong har Folkhälsomyndigheten justerat rekommendationerna för covid-19 vaccinationer. Detta innebär att Västerbotten även har fått en tilldelning på antalet doser av covid-19-vaccin som kan beställas.
- Samvaccination mot covid-19 och influensa startat 14 oktober.
- För de som endast rekommenderas influensavaccinering är startdatum 4 november
- Personer 65 år och äldre som bor på säbo erbjuds ett förstärkt influensavaccin som denna säsong är Fluad.
- Uppdaterat Comirnaty LP.8.1 vaccin mot covid-19 används denna säsong.
- Gå igenom era kylar och släng utgången influensavaccin och covid-19 vaccin som kan ligga kvar sedan förra säsongen eller vårens insats.

Covid-19 vaccin rekommenderas till följande grupper;

- Alla som är 75 år och äldre (födda 1950 eller tidigare)
- Personer från 65 år med dagliga omsorgsinsatser av hemtjänst eller boende på Säbo
- Personer i medicinska riskgrupper 50–74 år
- Personer 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar, njursvikt eller Downs syndrom

Influensavaccination rekommenderas till följande grupper;

- Alla som är 65 år och äldre (födda 1960 eller tidigare)
- Personer från 6 månader till 64 år i medicinska riskgrupper, inklusive gravida
- Vårdpersonal som arbetar patientnära
- Hushållskontakter, barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Bakgrund

Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer varje vintersäsong. Den årliga influensan drabbar många och särskilt äldre personer och personer i medicinska riskgrupper löper en betydligt ökad risk för allvarlig sjukdom. Årligen sker cirka 300–500 intensivvårdsinläggningar till följd av influensa och upp till 3000–5000 dödsfall. Vaccination är den bästa åtgärden för att minska risken för svår influensasjukdom.

Förutom personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa rekommenderas även personal som arbetar nära dessa personer att vaccinera sig. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också vaccination.

Influensavaccinets effekt varar i ungefär 6 månader. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de som cirkulerar. WHO:s mål är att minst 75 % av alla som fyller 65 år under 2025 eller är äldre vaccineras mot influensa. Förra säsongen vaccinerades 74 procent av länets invånare 65 år och äldre mot influensa.

[Rekommendationer om influensavaccination av riskgrupper \(folkalsomyndigheten.se\).](https://www.folkhalsomyndigheten.se/rekommendationer-om-influensavaccination-av-riskgrupper)

Covid-19 orsakas av coronaviruset Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) som upptäcktes 2019. Covid-19 sprids i första hand vid nära kontakter mellan personer, genom aerosol-, dropp- och kontaktsmitta. De vanligaste symtomen är förkylningssymtom, i vissa fall tillsammans med feber. För de flesta personer är sjukdomen lindrig och självläkande inom en vecka. Vissa grupper riskerar ett mer allvarligt förlopp, och i vissa fall behov av sjukhusvård till följd av covid-19. Alla åldersgrupper kan insjukna men framför allt äldre personer och personer med vissa underliggande sjukdomar har ökad risk för att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom.

Covid-19 förekommer året runt, med återkommande toppar i smittspridningen. Säsongsvariationen har de senaste åren inneburit störst smittspridning under höst och tidig vinter, men spridningen är fortfarande oförutsägbar.

Risken för allvarlig sjukdom vid covid-19 har gradvis minskat de senaste åren. Det beror bland annat på en utbredd immunitet efter sjukdom i befolkningen, och på att de virusvarianter som cirkulerat de senaste åren varit mindre benägna att orsaka allvarlig sjukdom än den ursprungliga. Vissa personer löper dock fortsatt risk för allvarlig sjukdom vid covid-19. Dessa personer har nytta av vaccination. Folkhälsomyndigheten har utifrån vetenskap, aktuella underlag om sjukdomsbörda och död i covid-19 inför denna säsong reviderat sina rekommendationer om vilka som har störst nytta av vaccination mot covid-19. Dessa rekommendationer gäller från 1 september 2025 och tills vidare.

[Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19 vaccinationer](#)

Personer som rekommenderas både covid-19 och influensavaccin rekommenderas samvaccination. Vid akut infektion och feber bör man skjuta upp vaccinationen eftersom vaccinationen då har sämre effekt.

Viktiga datum inför höstens vaccinationskampanj

- Tisdag **14 oktober startar** vaccinationsinsatsen för de som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa och covid-19.
- **4 november** startar vaccinationerna för de som enbart rekommenderas influensavaccinering, detta gäller även vård och omsorgspersonal som arbetar patientnära.
- Personer som inte rekommenderas vaccination mot influensa har möjlighet att vaccinera sig från **25 november**. Vaccinationen för dem kostar 350 kr.

Eftersom ingen säkert kan säga när influensan når sin kulmen eller hur allvarlig den kommer att bli denna vinter, bör det finnas möjlighet att vaccineras mot influensa så länge det cirkulerar i samhället. Så länge vi har bekräftade influensafall är det aldrig för sent att vaccinera

Den stora insatsen kring covid-19 vaccinationer pågår fram till 31/12–2025. Vaccineringar av riskgrupper kan förekomma efter detta datum eller om det epidemiologiska läget föranleder vaccinering.

Personer som rekommenderas samvaccination mot covid-19 och influensa

- Alla personer som fyller 75 år i år, eller är äldre.
- Personer från 65 år med dagliga omsorgsinsatser av hemtjänst eller boende på Säbo
- Personer 50–74 år med någon av underliggande sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19:
 - hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (högt blodtryck som enda diagnos ingår inte)
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 - diabetes mellitus typ 1 och 2
 - lever- eller njursvikt
 - personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom
 - sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel neuromuskulär sjukdom, flerfunktionsnedsättning eller obesitas med ett BMI på 40 eller högre

- Personer 18–49 år med nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller immunhämmande sjukdom eller tillstånd, till exempel blodcancersjukdomar, njursvikt och Downs syndrom
- Personer som inte omfattas av rekommendationerna enligt definitionerna ovan, men som har en svår grundsjukdom eller ett tillstånd som gör att covid-19 riskerar att få ett allvarligt förlopp, rekommenderas vaccination oavsett ålder. Exempel på sådan sjukdom kan vara svår lungsjukdom eller uttalad skörhet på grund av omfattande samsjuklighet eller flerfunktionsnedsättning. Läkarbedömning kan behövas för att identifiera dessa personer.

Ytterligare info om rekommendationer kring covid-19 vaccination

Personer som rekommenderas en dos covid-19-vaccin under hösten 2025 kan avstå vaccination om de haft bekräftad covid-19 efter 1 september 2025.

Barn

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall vid ökad risk för allvarlig covid-19. Läkarordination och enskild läkarbedömning krävs för detta och handläggning sker via länets barnkliniker.

Immunsupprimerade

Personer från 18 år med nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller immunhämmande sjukdom eller tillstånd, till exempel blodcancersjukdomar, njursvikt och Downs syndrom rekommenderas covid-19-vaccin.

Vaccination av personer 18–74 år som inte omfattas av rekommendation för covid-19 vaccination

Vaccin är ett läkemedel och läkare kan ordinera vaccinet till en person som inte omfattas av rekommendationen och vaccination kan göras efter en läkarordination. Observera att vaccination av personer som omfattas av rekommendationen prioriteras.

Personer som rekommenderas enbart influensavaccinering

- Alla personer 65–74 år som inte tillhör någon riskgrupp
- Personer i ålder 6 månader till 64 år som tillhör följande riskgrupper rekommenderas influensavaccination:
 - Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
 - Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 - Diabetes mellitus typ 1 och 2
 - Kronisk lever- eller njursvikt
 - Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom
 - Generellt nedsatt hälsa på grund av psykiatrisk sjukdom
 - Generellt nedsatt hälsa på grund av bruk av narkotika och/eller riskbruk av alkohol
- Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl kan vaccination tidigareläggas efter bedömning av medicinskt ansvarig läkare. ([se Vaccination av gravida mot influensa](#)). Tänk också på att gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta efter vecka 16 för att sedan skydda det nyfödda barnet. (se [Rekommendation-om-vaccination-mot-kikhosta-för-gravida, Folkhälsomyndigheten](#))

Personal inom vård och omsorg och vissa hushållskontakter

- Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som inte själva tillhör riskgrupp. För dessa kostar vaccinationen 350 kr
- Personal oavsett ålder som arbetar inom vård och omsorg som arbetar nära patienter, boende och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Influensavaccindoser bör sparas till personer i medicinska riskgrupper som tillkommer under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av en nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Kombination med andra vacciner

Standarddos influensavaccin samt högdos influensavaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både barn och vuxna. Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst andra armen eller benet.

Alla vaccinationer kan ge biverkningar, vanligtvis övergående smärta vid injektionsstället och lindrig feber. Detta är viktigt att tänka på vid vaccination av gravida och multisjuka personer med fler än två vacciner, då reaktionen kan bli kraftigare när man ger flera vacciner vid samma tillfälle.

Pneumokockvaccination

I samband med covid-19 och influensavaccinering kan det vara bra att se över status gällande pneumokockvaccination. Vaccination mot pneumokocker är inte säsongsbunden utan kan genomföras året om. Vaccination mot pneumokocker rekommenderas av Folkhälsomyndigheten till vuxna och barn över två år, om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Pneumokockvaccination är gratis i Västerbotten för personer 65 år och äldre och till övriga riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens definition. Revaccination rekommenderas vart femte år. Vaccinationsschema gällande pneumokockvaccination återfinns under denna länk;

[Pneumokockvaccination vuxna \(regionvasterbotten.se\)](https://regionvasterbotten.se).

- [Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper](#)
- [Folkhälsomyndigheten.se/Folkhälsomyndighetens-foreskrifter-HSLF-FS-2022-55](https://www.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsomyndighetens-foreskrifter-HSLF-FS-2022-55)

Patientinformation

Finns på 1177.se för både [covid-19](#) och [influensa](#).

[Folkhälsomyndighetens faktablad om covid-19 vaccinationer](#)

Behandlings- och bedömningsstöd

Äggallergi eller blödningsbenägenhet

Personer som haft en anafylaktisk reaktion som krävt sjukhusvård efter intag av livsmedel som innehåller ägg bör få en individuell läkarbedömning innan vaccination mot influensa. Både Vaxigrip®, Fluenz® och Fluad® odlas fram i hönsägg och små mängder av äggprotein kan finnas kvar, trots att vaccinet renas oerhört väl. Personer som kan äta ägg till exempel i sockerkaka eller bullar penslade med ägg kan vaccineras.

Om patienten har ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling se [Rutin – intramuskulär vaccinering vid proppförebyggande medicinering](#).

Allergiberedskap och behandling

Beredskap måste alltid finnas vid vaccinering för att kunna behandla överkänslighetsreaktioner enligt SOSFS 1999:26. Kraftig allergisk reaktion vid influensavaccination är mycket ovanligt.

Rekommenderade läkemedel att ha tillgång till för behandling av allergisk reaktion finns i rekommendationer från Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA 2024), [SFFA 2024 anafylaxi och allergiberedskap](#)

Observationstid efter vaccination

Den rekommenderade observationstiden efter vaccination är 5 - 15 min. Vaccinerande enhet kan välja den observationstid de känner sig trygga med och även individualisera observationstiden.

Vaccination i hemmet

Vaccin mot säsongsinfluensa är väl beprövat och är mycket säkert. En patient som tidigare vaccinerats mot influensa och covid-19 utan komplikationer, kan vaccineras i hemmet. Detta gäller under förutsättning att patienten svarat nej på frågorna i hälsodeklarationen.

Vid vaccination i hemmet ska det finnas tillgång till rekommenderade läkemedel för behandling av allergisk reaktion enligt SOSFS 1999:26, se under rubrik *Allergiberedskap och behandling*.

Även en blödningsbenägen patient kan vaccineras i hemmet, se under rubriken *Äggallergi och blödningsbenägenhet*.

Övergående biverkningar kan förekomma inklusive stressrelaterade reaktioner. Därför är det lämpligt att stanna kvar och prata med patienten i cirka 10 minuter.

Antiviral läkemedelsbehandling vid influensa

Oavsett vaccinationsstatus bör personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av influensa informeras om att kontakta vården vid tidiga symtom av influensa för ställningstagande till eventuell antiviral behandling. Vid smittspridning av influensa på exempelvis SÄBO för äldre kan förebyggande behandling sättas in. Se Läkemedelsverkets [behandlingsrekommendation-influensa.pdf](#) ([lakemedelsverket.se](#))

Influensavaccination av sjukvårdspersonal

Regionanställda

Vårdnära personal och studenter vaccineras i första hand på sin arbetsplats. Medarbetare på Nus som inte kan vaccineras på sin arbetsplats kan vaccinera sig på infektionsmottagningen. För detaljerad information om vad som gäller på respektive sjukhus, vänligen se, [Säsongsvaccination - Intranätet](#). Information kommer att läggas ut under oktober månad.

Kommunal vårdpersonal

Tre möjliga lösningar kring vaccination av vårdpersonal som arbetar inom kommunerna finns:

- Personalen bokar tid på hälsocentralen och betalar för sin vaccination, tar kvittot till sin arbetsgivare (kommunen) och får igen pengarna på sin kommande lön. Detta kräver en hel del administration framför allt för kommunen. Kostnad 350 kr/person
- Efter överenskommelse med hälsocentralen, förses HC med en lista på personal som ska vaccineras, personalen bokar tid eller kommer på förbokat tillfälle för vaccination och hälsocentralen skickar faktura på vaccinationerna. Kostnad 350 kr/person
- Kommunen kommer överens med hälsocentralen och hämtar vaccin (ofta i samband med att de hämtar vaccin för att vaccinera på SÄBO). Kommunen administrerar/vaccinerar sin personal själv och dokumenterar själva i MittVaccin. Kostnad 50 kr/person.

Hälsodeklaration och registrering i MittVaccin

Alla covid-19 och influensavaccinationer registreras i MittVaccin. Hälsodeklarationen fylls i av invånaren i MittVaccin vid bokning, eller vid vaccinationstillfället enligt gällande rutin, digitalt direkt i MittVaccin eller i vissa fall i pappersform och sedan i MittVaccin. Om man behöver hälsodeklarationer i pappersform går dessa att beställa via Mediq, artikelnummer 6092: generisk hälsodeklaration som gäller för både patienter och personal. Observera att om hälsodeklaration är gjord på papper så måste den dokumenteras även i mittvaccin.

Alla sjuksköterskor har behörighet inlagt i mittvaccin och på [intranätet finns manualer och utbildningsfilmer](#) för arbete i mittvaccin.

Upphandlade vacciner för influensa och covid-19

Regionens upphandlade influensavaccin är **Fluad®**, **Vaxigrip®** och det nasala barnvaccinet **Fluenz®**. Vaccinerna är sammansatta av ytantigener från inaktiverat virus från följande stammar: A/Victoria (H1N1)pdm09, A/Croatia (H3N2) och B/Victoria.

Fluad® är godkänt från 50 års ålder och vaccinet rekommenderas till brukare 65 år och äldre på SÄBO och personer 65 år och äldre med hemsjukvård. En dos är 0,5 ml och ges intramuskulärt. [FASS text: Fluad](#)

Vaxigrip® Är godkänt från 6 månaders ålder och uppåt. Vaccinet ges enligt de rekommendationer som gäller för influensavaccinering. En hel dos ges oavsett ålder. En dos är 0,5 ml och ges i första hand intramuskulärt men kan även ges subkutant. [FASS text: Vaxigrip](#)

- Barn i åldern 6 månader t.o.m. 8 år som tidigare inte har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att få skydd under den första säsongen de vaccineras. Doserna bör ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccinationen räcker en dos vid årlig säsongsvaccination.

Fluenz® är endast godkänt för barn och kan ordinerats till vissa riskgruppsbarn 2–17 år av barnläkare. Vaccinet är ett levande försvagat vaccin och ges nasalt. En dos är 0,2 ml (administrering 0,1 ml per näsborre). Ska inte ges till barn med immunbrist. [FASS text: Fluenz](#)

Comirnaty (LP.8.1) vuxendosen är godkänt från 12 år, men rekommenderas att ges endast till personer 18 år och äldre enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination. En dos är 30 mikrogram, 0,3 ml intramuskulärt. [FASS text: Comirnaty LP.8.1](#)

Beställning vaccin och kanyler inom Region Västerbotten

Alla vacciner levereras utan kanyler som måste beställas separat från Mediq. Varunummer 7416 för kanyl 23G 0.6x25mm, blå med stickskydd, som passar till förfylld spruta samt varunummer 7415 för kanyl 0.6x25 utan stickskydd. Sprutor med lågvolymer för covidvaccin har varunummer 8021.

Influensavacciner beställs direkt via Oriola. Orderstart för influensavacciner är 15 september enligt avtalet. Vaccinbeställningar som utgör fler än 10 doser ska beställas i detta flöde. Leveransavgift på 500 kr tas vid beställning om det är färre doser än 10 doser. Vid första beställning, kontakta grossist för upplägg av kundnummer. [Vacciner beställning, ledtider, transport och mottagning](#)

Kontaktuppgifter till Oriola:

Beställning via telefon: 0770-22 20 20

Allmänna frågor: kundservice@oriola.com (Alla frågor rörande leverans, saldo, utredningar)

Ny order: order@oriola.com, Önskar ni lägga en order, fråga efter Oriolas orderunderlag

Ny kund: nykund@oriola.com (Alla frågor som rör ny kundansökan)

Leveranstiden är vanligtvis inom 3 dagar om ordern är lagd innan kl 14.00. Observera att leveranstider kan vara längre vid högt tryck beställ därför influensavaccin i god tid. Leverans helgfri tisdag till fredag mellan 08.00-17.00.

Leverans sker direkt från grossist. På sjukhusen sker leveransen till godsmottagning och vidare av intern logistik till enheten. Grossisten ansvarar för kvaliteten under transporten.

Tabellöversikt över influensavacciner som beställs mest.

	Vaxigrip	Fluad
Förpackning	10-pack UTAN NÅLAR	10-pack UTAN NÅLAR
Artikelnummer	437717	193448
Antal doser tillgängliga	62 000 doser	4 500 doser

Fluad® (artikelnummer 193448). Finns att beställa från 15 september och beställs via Oriola.

Vaxigrip® (artikelnummer 437717) omfattas av upphandlingsavtal med orderstart 15 september från Oriola.

Fluenz® är ett nasalt levande vaccin som ges till vissa riskbarn. Vaccinet omfattas av upphandlingsavtal och beställs via Tamro.

Pneumovax® Upphandlingsavtal inte klart. Använd vaccin ni har i lager, mer information kommer när ett nytt avtal finns på plats.

Prevenar 20® (tidigare Apexxnar) omfattas av upphandlingsavtal och beställs via Oriola.

Lathund och kontaktuppgifter: [Vacciner beställning, ledtider, transport och mottagning](#)

Influensavaccin som beställs för **personal** som arbetar inom **Region Västerbotten** beställs på den vaccinerande arbetsplatsens kundnummer, men faktureras till referens DEJA01, Smittskyddsenheten.

Vaccin för patienter debiteras som vanligt på den vaccinerande enheten. Vaccin som ges till personal som arbetar inom kommunen faktureras kommunen, se rubrik kommunal vårdpersonal ovan.

Comirnaty LP.8.1 beställs som tidigare av Läkemedelscentrum. Lägg in önskat antal doser i önskefilen på teams senast onsdagar för leveranser fredagar veckan efter. Tänk på att inte ta hem för mycket vaccin, viktigt att försöka minska svinnet. En Excel fil är utskickad med data över antal listade som är 75 år och äldre på varje hälsocentral. Detta kan användas initialt för att uppskatta antal doser ni kan behöva beställa för hälsocentraler där det inte finns en central vaccinationsmottagning i kommunen.

Behörighet att ordinera och administrera vaccin

Vilka yrkeskategorier som kan ordinera vaccin finns reglerat i (HSLF-FS 2018:43):

Läkare är behörig att ordinera. Sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktsköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan ordinera influensa- och pneumokockvaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även sjuksköterskor som genomgått likvärdig utbildning som godkänts av verksamhetschefen kan ordinera vaccin, [Behörighetsbedömning influensa och pneumokockvaccin, ifyllbar](#).

Generellt direktiv kan utfärdas av läkare (HSLF-FS 2017:37 kap 6, 6§) så att andra sjuksköterskor än de som är behöriga att ordinera under vissa beskrivna förutsättningar ska kunna administrera vaccin mot säsongsinfluensa och pneumokocker på en vårdenhets utan specifik ordination för varje patient, Blankett hittas på [hemsidan](#) under rubrik rutindokument (blankett 2).

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 får nedanstående beskrivna sjuksköterskor ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19. Blanketterna återfinns på hemsidan under länkar nedan;
[Information om rätt att ordinera och administrera vaccin mot covid-19](#)

[Blankett för dokumentation av ordinationsrätt för vaccin mot covid-19](#)

Administration av ordinerade vacciner kan utföras av alla läkare och sjuksköterskor.

Avgifter för patient inom Region Västerbotten

För personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av influensa är vaccinering mot influensa och covid-19 kostnadsfritt. Pneumokockvaccination för riskgrupper samt alla 65 år och äldre är kostnadsfritt i Västerbotten sedan 2021. Vårdpersonal får influensavaccin kostnadsfritt via sin arbetsgivare, se rubrik Vaccination av vårdpersonal.

Personer som inte rekommenderas covid-19 vaccin behöver en läkarordination och betalar 300 kronor.

Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som inte själva tillhör riskgrupp men rekommenderas influensavaccinering betalar 350 kr.

Övriga personer som inte rekommenderas influensavaccination betalar 350 kronor.

2025-09-17

Smittskyddsenheten i samarbete med Läkemedelscentrum

Region Västerbotten www.regionvasterbotten.se/smittskydd